

各 関 係 機 関 御 中

石川県農林総合研究センター所長
(公 印 省 略)

病害虫発生予察情報について

令和 7 年度病害虫発生予察注意報第 4 号を下記のとおり送付します。

連絡先	石川県農林総合研究センター 中央普及支援センター 病害虫防除室 電話 076-257-6972 (直通) FAX 076-257-9140 E-mail kisk0301@pref.ishikawa.lg.jp
-----	---

注意報第4号

シロイチモジヨトウの多発に注意

1 注意報の内容

作 物 名 : ねぎ、アブラナ科野菜等
病 害 虫 名 : シロイチモジヨトウ
対 象 地 域 : 県内全域
発 生 量 : 多

2 注意報発表の根拠

- 1) 8 月第 2 半旬以降のフェロモントラップへの誘殺数は、平年の約 4 倍となっており多い (図 1)。
- 2) 県内での被害が多く報告されている。
- 3) 8 月 2 1 日付け気象庁の予報によれば、北陸地方の向こう 1 か月の気温は高いと予想されている。

3 防除上の注意事項

- 1) シロイチモジヨトウ幼虫は、中齢期以降は薬剤抵抗性が強くなり、分散、食入する習性があるのでふ化直後～若齢期に防除する。
- 2) ジアミド系殺虫剤の感受性が低下し、多発すると防除が困難になる場合がある。
- 3) 施設栽培では、開口部に寒冷紗等を設置して成虫の侵入を防止する。

※ 農薬の使用に当たっては、最新の農薬使用基準を確認し、遵守する。 また、周辺作物への飛散防止に留意する。
--

(資料)




図1 フェロモントラップのシロイチモジヨトウ誘殺数 (かほく市内日角)

※平年値は、過去10年 (H27～R6年) の平均



写真 シロイチモジヨトウ幼虫